

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE HABILIDADES DEL PROVEEDOR DEL CURSO DE RCP DEA

Después de completar el curso en línea de RCP + DEA de Pacific Medical Training, envíe este formulario completo por correo electrónico con la credencial de instructor BLS de su instructor a support@pacificmedicaltraining.com. El instructor debe tener una credencial de instructor válida de la American Heart Association. Pondrán sus iniciales en cada área que se haya completado con éxito. Tenga en cuenta que el instructor NO le emite una tarjeta nueva. Su tarjeta CPR+AED de Pacific Medical Training se emite directamente desde Pacific Medical Training.

Soporte vital cardíaco básico para adulto

HABILIDAD	APROBADO	REQUIERE RECURSE
Reconocer que el paciente no respira normalmente y no responde <ul style="list-style-type: none"> ● Activa los SME o el sistema interno de emergencias ● Consigue o envía a alguien a buscar el DEA 		
Inicia las compresiones a un ritmo de 100-120/min <ul style="list-style-type: none"> ● Comprime el pecho al menos 5 cm ● Permite el retroceso completo del tórax 		
Abre la vía aérea mediante la inclinación de la cabeza/elevación del mentón <ul style="list-style-type: none"> ● Ventila con éxito utilizando una ración de 30:2 		
Conecta y utiliza el DEA tan pronto como llegue <ul style="list-style-type: none"> ● Continúa con las compresiones mientras el DEA se carga ● Despeja para la descarga ● Inicia las compresiones inmediatamente después de la descarga ● Cambia los compresores cada 2 minutos 		

Soporte vital cardíaco básico para niño

HABILIDAD	APROBADO	REQUIERE RECURSE
Reconocer que el paciente no respira normalmente y no responde <ul style="list-style-type: none"> ● Activa los SME o el sistema interno de emergencias ● Consigue o envía a alguien a buscar el DEA ● Si no hay nadie disponible para ayudar, comience las maniobras de RCP durante 2 minutos, luego active los servicios de emergencia y busque el desfibrilador automático externo (DEA). 		
Inicia las compresiones a un ritmo de 100-120/min <ul style="list-style-type: none"> ● Comprima el pecho del niño al menos 1/3 (aproximadamente 5 cm) utilizando una o dos manos, dependiendo del tamaño del niño. ● Permite el retroceso completo del tórax 		
Abre la vía aérea mediante la inclinación de la cabeza/elevación del mentón <ul style="list-style-type: none"> ● Ventila con éxito utilizando una ración de 30:2 		
Conecta y utiliza el DEA tan pronto como llegue <ul style="list-style-type: none"> ● Coloque los parches del DEA según las imágenes que aparecen en los parches. ● Continúa con las compresiones mientras el DEA se carga ● Si se recomienda una descarga eléctrica: <ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que nadie toque al paciente. - Presione el botón de descarga. - Inicie las compresiones inmediatamente después de la descarga. ● Cambie de reanimador cada 2 minutos o antes si se cansa. 		

SopORTE vital cardíaco básico para lactante

HABILIDAD	APROBADO	REQUIERE RECURSE
Reconocer que el paciente no respira normalmente y no responde <ul style="list-style-type: none"> ● Toque o mueva los pies para comprobar si hay respuesta. ● Active el servicio de emergencias médicas o el sistema de emergencia interno. ● Si hay alguien disponible, pídale que busque el desfibrilador automático externo (DEA). Si no hay nadie disponible, comience la reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 2 minutos y luego active el servicio de emergencias médicas y busque el DEA. 		
Inicia las compresiones a un ritmo de 100-120/min <ul style="list-style-type: none"> ● Comprima el tórax del lactante al menos 1/3 de su profundidad (aproximadamente 3,8 cm) utilizando la palma de una mano o rodeando el tórax con las manos justo debajo de la línea de los pezones. ● Permita la expansión completa del tórax. 		
Abre la vía aérea mediante la inclinación de la cabeza/elevación del mentón <ul style="list-style-type: none"> ● Ventila con éxito utilizando una ración de 30:2 		
Conecte y utilice el desfibrilador externo automático (DEA) inmediatamente cuando esté disponible. <ul style="list-style-type: none"> ● Elija los parches pediátricos, si están disponibles. Si no, tenga en cuenta que se pueden usar los parches para adultos. ● Coloque los parches del DEA según las imágenes que aparecen en los parches. ● Continúe con las compresiones torácicas en todo momento, excepto cuando el DEA lo indique. ● Si se recomienda una descarga, reanude inmediatamente las compresiones mientras el DEA se carga. <ul style="list-style-type: none"> - Asegúrese de que nadie toque al paciente. - Presione el botón de descarga. - Inicie las compresiones inmediatamente después de la descarga. ● Si no se recomienda una descarga, reanude las compresiones torácicas durante 2 minutos. ● Cambie de reanimador cada 2 minutos o antes si se cansa. 		

La información anterior es precisa a mi leal saber y entender. El INSTRUCTOR posee una credencial de instructor BLS válida de la American Heart Association. El ESTUDIANTE ha demostrado exitosamente las habilidades enumeradas anteriormente.

ESTUDIANTE		
_____ Nombre	_____ Firma	_____ Fecha
_____ Estado y número de licencia		

INSTRUCTOR		
_____ Nombre	_____ Firma	_____ Fecha
_____ Profesión	_____ Especialidad	